

Wie kannst du feststellen, ob du kurzsichtig bist?

- 1 Musst du deine Augen zusammenkneifen, um weit entfernte Objekte klarer sehen zu können?
- 2 Musst du ganz nah an Dinge herangehen, um sie klar sehen zu können?
- 3 Findest du es schwierig, Texte an der Tafel zu lesen?
- 4 Fällt es dir beim Sport schwer, weit entfernte Ziele zu erkennen?
- 5 Hast du nach einem langen Schultag Kopfschmerzen?

Falls du eine oder mehrere der Fragen mit „Ja“ beantwortet hast, könnte es sein, dass du kurzsichtig bist.

Sage es deinen Eltern oder Lehrer*innen, falls du diese Anzeichen bei dir bemerkst. Sie sind da, um dir zu helfen!

Entscheiden Sie sich für Essilor® Stellest® Brillengläser mit Tönung, damit Ihr Kind auch bei Aktivitäten im Freien weiter Essilor® Stellest® Brillengläser mit UV-Schutz, reduzierter Blendung und komfortabler Sicht tragen kann.*



Neben der Verwendung von Essilor® Stellest® Brillengläsern können Sie folgende Schritte unternehmen, um die Augengesundheit Ihres Kindes zu fördern:

1. Erhöhen Sie die Zeit, die Ihr Kind im Freien verbringt, auf mindestens zwei Stunden täglich.⁸
2. Wenden Sie die 20-20-20-Regel an (d.h. den Blick alle 20 Minuten mindestens 20 Sekunden lang auf ein 20 Fuß (6 Meter) entferntes Objekt richten).

WENDEN SIE SICH AN IHREN AUGENOPTIKER, UM MEHR ÜBER ESSILOR® STELLEST® BRILLENGLÄSER ZU ERFAHREN.

*Die Farben der Kategorie 3 entsprechen nicht den ISO-Normen zur Verwendung bei Nacht im Straßenverkehr und beim Fahren.
1. Bao J, et al. Spectacle Lenses With Aspherical Lenslets for Myopia Control vs Single-Vision Spectacle Lenses: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol. 2022;140(5): 472-478.
2. Holden BA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123:1036-42.
3. Sankaridurg P, et al. IMI Impact of Myopia. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2021;62:2-2.
4. Haarmann AEG, et al. The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):149. doi:10.1167/iov.61.4.49.
5. Gao Y, et al. The impact of spectacle lenses for myopia control on visual functions. Ophthalmic Physiol Opt. 2021;41(6):1320-1331.
6. Li X, et al. Myopia control efficacy of spectacle lenses with highly aspherical lenslets: results of a 5-year follow-up study. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2024 Jun 17;65(7):131.
7. Bao J, et al. One-year myopia control efficacy of spectacle lenses with aspherical lenslets. British Journal of Ophthalmology. 2022;106:171-6.
8. Xiang S, et al. Time spent in outdoor activities in relation to myopia prevention and control: a meta-analysis and systematic review. Acta ophthalmologica. 2017 Sep;95(6):551-66.

Essilor® und Stellest® sind Marken von Essilor International. ©Essilor International - November 2024



Stellest®

Essilor®
#1

der weltweit von Augenoptiker:innen empfohlenen Brillenglas-Marken*



Essilor® Stellest® Brillengläser verlangsamen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit im Durchschnitt um 67 %.^{†1}



*Verglichen mit 50 kurzsichtigen Kindern, die in Wenzhou, China, Einstrahlungsbrillengläser trugen. Die Ergebnisse basieren auf 32 Kindern aus der Testgruppe, die zwei Jahre lang täglich mindestens 12 Stunden lang Essilor® Stellest® Linsen trugen.

^{†1}Im Vergleich zu Einstärkengläsern, wenn sie über zwei aufeinanderfolgende Jahre 12 Stunden am Tag getragen werden



Kurzsichtigkeit (Myopie) ist ein Zustand, bei dem Menschen nähere Objekte klar sehen können, weiter entfernte Objekte jedoch verschwommen erscheinen.¹

Die Prävalenz von Kurzsichtigkeit nimmt stetig zu, vor allem bei Kindern.²

Kurzsichtigkeit kann die Sehkraft und die Lebensqualität eines Kindes stark beeinträchtigen. Jede Dioptrien mehr Kurzsichtigkeit kann im Laufe der Zeit ein erhöhtes Risiko für weitere Augenerkrankungen und Sehbeeinträchtigungen im späteren Leben mit sich bringen.^{3,4}

KURZSICHTIGKEIT BESTEHT EIN LEBEN LANG UND KANN BIS IN DAS (JUNGE) ERWACHSENENALTER FORTSCHREITEN.

1. Yu L, Li ZK, Gao JR, Liu JR, Xu CT. Epidemiology, genetics and treatments for myopia. International journal of ophthalmology. 2011;4(6):658-669.

KORRIGIEREN SIE KURZSICHTIGKEIT NICHT EINFACH MIT EINSTÄRKENBRILLENGLÄSERN.

ENTSCHEIDEN SIE SICH DAFÜR, DAS FORTSCHREITEN DER KURZSICHTIGKEIT ZU KONTROLLIEREN.

Stellest® Brillengläser sind die beste Lösung von Essilor®, um das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern zu verlangsamen.

 Kurzsichtigkeit korrigieren

 Das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit kontrollieren

67% langsames Fortschreiten der Kurzsichtigkeit im Durchschnitt¹

 Ohne Kompromisse
Ästhetisch, unkompliziert und sicher.^{1,5}


 Empfohlene Tragedauer für Essilor® Stellest® Brillengläser: mindestens 12 Stunden jeden Tag*¹

¹Ergebnisse einer zweijährigen prospektiven, kontrollierten, randomisierten und doppelverblindeten klinischen Studie von 54 myopen Kindern, die Essilor® Stellest® Gläser trugen, im Vergleich zu 50 myopen Kindern, die Einstärkengläser verwendeten (Ort: Wenzhou, China). Die Ergebnisse resultieren von 32 Kindern aus der Testgruppe, die Essilor® Stellest® Gläser über einen Zeitraum von zwei aufeinanderfolgenden Jahren täglich mindestens 12 Stunden trugen.

⁵Die Essilor® Stellest® Brillengläser bestehen aus AIRWEAR® Polycarbonat, das stoßfest ist und die UV-Strahlung zu 100 % abschirmt. In Bezug auf die Sehleistung hat die Forschung gezeigt, dass die Essilor® Stellest® Brillengläser die zentralen und peripheren Sehfunktionen nicht beeinträchtigt.

Essilor® Stellest® Brillengläser, eine geniale Innovation, um das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit zu verlangsamen:


 KORRIGIEREN SIE KURZSICHTIGKEIT MIT EINER EINSTÄRKENZONE FÜR SCHARFES SEHEN.



 KONTROLLIEREN SIE DAS FORTSCHREITEN DER KURZSICHTIGKEIT MIT HILFE DER H.A.L.T. TECHNOLOGIE, EINER KONSTELLATION AUS UNSICHTBAREN* MIKROLINSEN.

Die Lichtstrahlen, die die Mikrolinsen passieren, erzeugen vor der Netzhaut ein „Volumen“ aus abgelenkten Signalen, das der Form der Netzhaut folgt und das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit verlangsamen kann.

HALT: Highly Aspherical Lenslet Target. *Ästhetisches Oberflächendesign

 Über einen Zeitraum von fünf Jahren verlangsamen Essilor® Stellest® Brillengläser das Fortschreiten der Myopie im Durchschnitt um die Hälfte*⁶

 Essilor® Stellest® Brillengläser bewiesen im Myopie-Management eine anhaltende Wirksamkeit bis zum Alter von 18 Jahren.^{1,6}



Handeln Sie jetzt: Verlangsamen Sie das Fortschreiten der Myopie bei Ihrem Kind mit Essilor® Stellest® Brillengläser!⁷

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Augenoptiker oder scannen Sie den nachfolgenden QR-Code.



⁶Verglichen mit der 60-monatigen Progression der extrapolierten Kontrollgruppe (vorhergesagter durchschnittlicher jährlicher Rückgang des sphärischen Äquivalents um 97 % basierend auf der anfänglichen 2-Jahres-Kontrollgruppe, Smotherman C, et al. IOVS 2023;64:ARVO E-Abstract 811).

^{1,6}An der randomisierten klinischen Studie nahmen Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren teil. Nach 5 Jahren lag die Altersspanne der Kinder, die in der Studie und den Folgestudien von den Essilor® Stellest® Brillengläsern profitierten, zwischen 8 und 18 Jahren.

⁷In der klinischen 2-Jahres-Studie mit Essilor® Stellest® Brillengläsern zeigte sich bei Kindern mit Einstärkengläsern eine schnellere Myopieprogression in jüngerem Alter. Dieser Trend trat bei Kindern, die Essilor® Stellest® Brillengläser trugen, nicht auf - ihre Myopieprogression war unabhängig vom Alter.

STELLEST® BILDERRÄTSEL FÜR KINDER

Unser Weltraumabenteurer Skyler (rechts) ist in Schwierigkeiten!

Er ist kurzsichtig!

Wir brauchen deine Hilfe, um Skylers Sehprobleme zu lösen!

Kannst du ihm bitte helfen, die Unterschiede in den beiden Bildern zu finden?



Bitte deine Eltern, den QR-Code zu scannen, und finde die Lösungen des Stellest® Bilderrätsels in den Story-Highlights auf unserer Instagram-Seite.

